

พื้นที่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าในเขตสุขภาพที่ ๘

จังหวัด	อำเภอ	พบโรคในสัตว์ปี	จังหวัด	อำเภอ	พบโรคในสัตว์ปี
เลย	ท่าลี่	56,57,60,61	หนองคาย	เมือง	58,60,61
	นาแห้ว	58,61		สระใคร	59-61
	ด่านซ้าย	57-60		โพนพิสัย	60
	เอราวัณ	58,60			
	นาด้วง	59			
	ภูเรือ	58			
	วังสะพุง	58			
นครพนม	เมือง	59	อุดรธานี	เพ็ญ	59,60
				หนองหาร	59



มาตรการเชิงรุกป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน

กระทรวงสาธารณสุข

ป้องกันโรค
(Prevent)

ค้นหาตรวจจับ
ความผิดปกติ
(Detect)

ตอบโต้รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ
(Respond)



ป้องกันโรค (Prevent)

- พื้นที่จัดทำแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามระดับความเสี่ยง
 - **จังหวัดเสี่ยง** : ทุก พชอ. มีแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 - **อำเภอเสี่ยง** : จัดทำแผนฯ ตามมาตรการเชิงรุกฯ
 - **พื้นที่เฝ้าระวัง** : จัดทำแผนสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
- พัฒนาระบบประสานงาน กรณีพบสัตว์ / ผู้สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค ให้มีข้อมูลครอบคลุม
- พัฒนาระบบการเก็บ/ส่งตัวอย่างเพื่อยืนยันโรคพิษสุนัขบ้า
- จัดให้มีบริการวัคซีน/ RIG ในสถานบริการอย่างเพียงพอ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร
- สื่อสารความเสี่ยงเชิงรุกทั้งก่อน-หลังถูกกัด
- ส่งเสริมการนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้



ค้นหาตรวจจับความผิดปกติ (Detect)

- ค้นหาผู้สัมผัส และกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลตาม CPG และติดตามมารับวัคซีน 100%



- ค้นหาปัจจัยเสี่ยง-พฤติกรรมไม่มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ส่ง LAB ตามแนวทางที่กำหนด





ตอบโต้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ (Respond)

กรณีพบผู้เสียชีวิต (มาตรการ 1-2-3)

1 วัน	<ul style="list-style-type: none">▪ สสจ.รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด▪ ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานร่วมๆ▪ ลงพื้นที่เพื่อสอบสวนและควบคุมโรคร่วมกัน	บูรณาการงานร่วมกับ ปศ./อปท./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2 วัน	<ul style="list-style-type: none">▪ ค้นหาผู้สัมผัสโรคและติดตามให้มารับวัคซีน▪ สื่อสารความเสี่ยงระดับพื้นที่/สื่อท้องถิ่น	
3 กม.	<ul style="list-style-type: none">▪ ประสาน ปศ.สำรวจ/ให้วัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมีอย่างต่ำ 3 กม.	

จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค



ตอบโต้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ (Respond)

กรณีตรวจพบหัวสัตว์ให้ผลบวกต่อเชื้อพิษสุนัขบ้า 1 ตัว

1 สัปดาห์ +

ปศข./
ปศจ./
ปศอ.

แจ้งข่าวสัตว์พบเชื้อ

Tel/Line

สคร.

สสจ.

สสอ./รพ.สต./SRRT.

2 วัน

- ค้นหา-ติดตามผู้สัมผัสโรคให้มารับวัคซีนตามกำหนด 100%
- ร่วมสอบสวนและควบคุมโรคร่วมกับพื้นที่
- แจ้งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละระดับโดยเร็วที่สุด
- สื่อสารความเสี่ยงระดับพื้นที่

3 กม.

- ประสาน ปศ.สำรวจ/ให้วัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมีอย่างต่ำ 3 กม.

บูรณาการงานร่วมกับ ปศ./อปท./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค