

ผลการดำเนินงาน **วัคซีนโรค**
จังหวัดหนองคาย ปี 2565

ตัวชี้วัด




อัตราผลสำเร็จ
การรักษา
วัณโรคปอด
รายใหม่
ร้อยละ 88



อัตราการความ
ครอบคลุมของ
การขึ้นทะเบียน
รักษาผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ำ
ร้อยละ 88

อัตราผลสำเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ $\geq 88\%$ (1/2565) จังหวัดหนองคาย (รายอำเภอ)



ข้อมูลจากโปรแกรม NTIP ณ วันที่ 17 กพ 65

อัตราผลสำเร็จในการรักษาวัณโรค จังหวัดหนองคาย (1-2565)


| โรงพยาบาล | เป้าหมาย | กำลังรักษา | รักษาสำเร็จ | ล้มเหลว | เสียชีวิต | ขาดยา | โอนออก |
|--------------|----------|------------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|
| หนองคาย | 34 | 32(94.2%) | - | - | 1(2.9%) | 1(2.9%) | - |
| ท่าบ่อ | 11 | 10(90.9%) | - | - | 1(9.1%) | - | - |
| โพนพิสัย | 26 | 20(76.9%) | - | - | 2(7.6%) | - | 4(15.3%) |
| ศรีเชียงใหม่ | 11 | 7(63.7%) | - | - | - | - | 4(36.3%) |
| สังคม | 4 | 2(50%) | - | - | 2(50%) | - | - |
| สระใคร | 7 | 6(86.7%) | - | - | - | - | 1(14.3%) |
| เฝ้าไร่ | 6 | 5(83.3%) | - | - | - | - | 1(16.7%) |
| รัตนวาปี | - | - | - | - | - | - | - |
| โพธิ์ตาก | 4 | 2(50%) | - | - | - | - | 2(50%) |
| รวม | 103 | 84(81.5%) | - | - | 6(5.8%) | 1(0.9%) | 12(11.6%) |

สาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค รอบที่ 1/2565

| โรงพยาบาล | เพศ | อายุ | สาเหตุการเสียชีวิต |
|--------------|-----|------|---|
| หนองคาย | ชาย | 47 | Accident , Traumatic Jejunal perforate |
| ท่าบ่อ | ชาย | 54 | ไม่ทราบสาเหตุ |
| ศรีเชียงใหม่ | ชาย | 37 | Pneumonia, respiratory distress failure |
| | ชาย | 81 | Heart Failure |
| โพนพิสัย | ชาย | 23 | โรคหัวใจ |
| | ชาย | 64 | เลือดออกในกระเพาะ |

ข้อมูลจากโปรแกรม NTIP ณ วันที่ 17 กพ 65

ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ $\geq 88\%$ จังหวัดหนองคาย ปี 2565 (รายอำเภอ)



ข้อมูลจากโปรแกรม NTIP ณ วันที่ 17 กพ 65

แผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ปีงบประมาณ 2565

1. การประชุมติดตามผลการดำเนินงานวัณโรคผ่านระบบ ZOOM
2. การประชุม Mortality & Morbidity Conference ผ่านระบบ ZOOM
3. การนิเทศติดตามการดำเนินงานวัณโรคในระดับอำเภอ
4. การอบรมผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัณโรคของโรงพยาบาล
5. การดำเนินงานการรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในกลุ่มผู้สัมผัสวัณโรค

ปัญหาอุปสรรค

1. การเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคยังสูง
2. การเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคยังทำได้ค่อนข้างต่ำ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
3. การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัณโรค ซึ่งมีผู้รับผิดชอบคนใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านหลักสูตร
การอบรม ได้แก่ รพ.ศรีเชียงใหม่, รพ.โพธิพิสัย, รพ.เฝ้าไร่, รพ.รัตนวาปี