



ที่ สธ ๐๒๓๓.๐๔/๑๒๐๔

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

๔ ถนนอิทธิยาภิบาล จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว ๓๓๐

ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งแผนการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 สำหรับเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยมีแนวทาง ดังนี้

๑. การยืนยันขอรับจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ในวันที่ ๕ และ ๒๐ ของทุกเดือน
 ๒. การขอสนับสนุนวัคซีนโควิด 19 เพิ่มเติมนอกแผน ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทำหนังสือถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาขอรับจัดสรรจากกรมควบคุมโรคต่อไป
 ๓. การสำรองวัคซีนอย่างน้อย ๑ เดือน หากวัคซีนหมดอายุให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุหรือประสานแนวทางจากกลุ่ม Logistic กรมควบคุมโรค
 ๔. ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานบริการให้บริการผู้เข้ารับบริการ แม้จำนวนไม่ครบตามจำนวนโดสต่อขวด
 ๕. ขอให้ทุกหน่วยบริการบันทึกผลการฉีดวัคซีนใน MOPH IC รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมษฐ์ กิ่งไก่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โทร. ๐ ๔๒๒๑-๔๒๐๗-๘ ต่อ ๓๐๑

โทรสาร ๐ ๔๒๒๑-๔๒๐๙

ผู้ประสานงาน นายพัฒนากร อุดมภัย

โทร. ๐๙ ๒๙๓๘-๙๖๖๒



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

Liaison EOC

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

เลขรับ 200

วันที่ 3 พ.ค. 65

เวลา 09.31

ส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ ต่อ ๑๓๓

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว ๓๓๐

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๓ (๙)

ห้องผู้ตรวจราชการ เขต

เลขรับ 716

วันที่รับ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕

วันที่ออก 10.57

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 โดยพิจารณาภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ร่วมกับผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้วัคซีนตามที่ให้บริการจริงในประเทศ รวมทั้งสถานการณ์และเงื่อนไขในการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๔๓๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๔๓๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงได้จัดทำแผนจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งแผนการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 สำหรับเดือนเมษายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) และแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) พร้อมทั้ง ขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีแนวทาง ดังนี้

๑. การยืนยันขอรับจัดสรรวัคซีนตามแผนการจัดสรรวัคซีนโควิด 19

๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการบันทึกและยืนยันข้อมูลการขอรับจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ผ่าน Google Sheet ของกรมควบคุมโรค โดยจะเปิดให้บันทึกข้อมูลภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ในวันที่ ๕ และวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน และปิดการรับข้อมูลใน เวลา ๑๒.๓๐ น. ในวันที่ ๗ และวันที่ ๒๒ ของทุกเดือน หากวันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการจะดำเนินการ ในวันทำการถัดไป

๑.๒ การจัดส่งวัคซีน จะดำเนินการจัดส่งวัคซีนภายใน ๓ วันทำการ นับจากวันที่ผู้บริหาร อนุมัติแผนจัดสรรวัคซีน และจะส่งหนังสือนำส่งวัคซีนให้กับหน่วยงานภายใน ๓ วันทำการ นับจากวันที่ผู้บริหาร ลงนามในหนังสือฉบับดังกล่าว

๒. การขอสนับสนุนวัคซีนโควิด 19 เพิ่มเติมนอกแผนการจัดสรร ได้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทำหนังสือถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนวัคซีนโควิด 19 จากกรมควบคุมโรคต่อไป ทั้งนี้ โดยกรมควบคุมโรคจะใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย ๕ วันทำการ นับจากวันที่ หนังสือฉบับจริงส่งถึงกรมควบคุมโรค

๓. ขอให้ทุกพื้นที่ดำเนินการสำรองวัคซีนโควิด 19 สำหรับให้บริการประชาชนล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ เดือน ทั้งนี้ หากวัคซีนหมดอายุให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุหรือประสานแนวทางจากกลุ่มบริหาร เวชภัณฑ์และโลจิสติกส์ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

แผนการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 เดือนเมษายน 2565

เขตสุขภาพ	จังหวัด	วัคซีน Sinovac สำหรับอายุ 6 ปี ขึ้นไป (โดส)	วัคซีน AstraZeneca สำหรับเป็นเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (โดส)	วัคซีน Pfizer (ฝ่าม่วง) สำหรับเป็นเข็มที่ 1 และ 2 ผู้ที่มีอายุ 12 - 17 ปี และสำหรับเป็นเข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (โดส)	วัคซีน Pfizer (ฟ้าสีส้ม) เด็กอายุ 5-11 ปี (เข็ม 2 และเข็ม 1 เก็บตก)	รวมจำนวนวัคซีน ที่จัดสรร (โดส)
1	เชียงราย	8,757	54,843	48,159	24,140	135,899
1	เชียงใหม่	11,366	86,305	75,151	31,360	204,182
1	น่าน	3,251	15,630	13,038	8,990	40,909
1	พะเยา	2,803	23,886	21,158	7,750	55,596
1	แพร่	2,487	20,385	17,889	6,850	47,611
1	แม่ฮ่องสอน	2,311	11,165	10,053	6,400	29,929
1	ลำปาง	4,056	30,237	25,824	11,180	71,297
1	ลำพูน	2,486	18,652	15,927	6,850	43,916
2	ตาก	5,367	26,971	24,547	14,850	71,735
2	พิษณุโลก	5,973	44,627	39,465	16,510	106,574
2	เพชรบูรณ์	6,961	46,349	41,440	19,310	114,060
2	สุโขทัย	3,904	34,280	31,234	10,820	80,238
2	อุตรดิตถ์	2,838	24,576	22,135	7,850	57,399
3	กำแพงเพชร	5,182	35,530	32,101	14,370	87,184
3	ชัยนาท	2,146	17,038	15,274	5,940	40,398
3	นครสวรรค์	7,158	54,892	49,263	19,780	131,093
3	พิจิตร	3,678	27,397	24,766	10,170	66,011
3	อุทัยธานี	2,356	18,339	16,717	6,550	43,963
4	นครนายก	1,872	14,729	13,286	5,200	35,087
4	นนทบุรี	8,220	57,952	49,147	24,680	139,999
4	ปทุมธานี	8,463	78,036	68,833	18,900	174,232
4	พระนครศรีอยุธยา	5,938	50,337	44,807	16,940	118,022
4	ลพบุรี	5,052	39,655	35,313	13,950	93,971
4	สระบุรี	5,083	42,290	37,811	15,990	101,175
4	สิงห์บุรี	1,371	11,120	9,901	3,790	26,182

แผนการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 เดือนเมษายน 2565

เขตสุขภาพ	จังหวัด	วัคซีน Sinovac สำหรับอายุ 6 ปี ขึ้นไป (โดส)	วัคซีน AstraZeneca สำหรับเป็นเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (โดส)	วัคซีน Pfizer (สามวง) สำหรับเป็นเข็มที่ 1 และ 2 ผู้ที่มีอายุ 12 - 17 ปี และสำหรับเป็นเข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (โดส)	วัคซีน Pfizer (สามวง) เด็กอายุ 5-11 ปี (เข็ม 2 และเข็ม 1 เกือบตก)	รวมจำนวนวัคซีน ที่จัดสรร (โดส)
4	อ่างทอง	1,883	13,783	12,284	5,220	33,170
5	กาญจนบุรี	6,488	55,483	51,223	14,990	128,184
5	นครปฐม	6,390	59,316	54,391	17,650	137,747
5	ประจวบคีรีขันธ์	4,300	35,858	32,609	11,850	84,618
5	เพชรบุรี	3,444	33,841	31,051	9,540	77,876
5	ราชบุรี	6,154	55,835	50,792	16,930	129,710
5	สมุทรสงคราม	1,161	10,469	9,377	3,250	24,257
5	สมุทรสาคร	4,757	61,582	55,331	13,010	134,680
5	สุพรรณบุรี	6,008	48,733	44,074	16,580	115,395
6	ฉันทบุรี	4,218	34,989	31,774	11,610	82,592
6	ฉะเชิงเทรา	5,560	46,452	41,645	15,380	109,037
6	ชลบุรี	12,628	128,923	112,622	34,920	289,093
6	ตราด	1,704	14,221	12,996	4,710	33,631
6	ปราจีนบุรี	3,949	33,370	30,166	10,910	78,395
6	ระยอง	6,636	48,770	43,720	18,240	117,366
6	สมุทรปราการ	8,970	87,808	73,266	24,960	197,004
6	สระแก้ว	4,581	30,083	27,460	12,690	74,814
7	กาฬสินธุ์	7,021	47,315	42,592	19,410	116,339
7	ขอนแก่น	13,044	93,386	83,252	36,030	225,712
7	มหาสารคาม	6,359	43,467	38,490	17,590	105,906
7	ร้อยเอ็ด	8,904	64,036	57,687	24,610	155,237
8	นครพนม	5,534	32,873	29,589	15,310	83,305
8	บึงกาฬ	3,601	22,893	20,970	9,960	57,424
8	เลย	4,971	42,009	38,547	13,740	99,268
8	สกลนคร	8,969	61,793	56,336	24,810	151,907
8	หนองคาย	3,873	31,776	29,158	10,700	75,507
8	หนองบัวลำภู	3,902	29,238	26,803	10,820	70,763
8	อุดรธานี	11,948	91,472	81,296	32,990	219,706

แผนการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 เดือนเมษายน 2565

เขตสุขภาพ	จังหวัด	วัคซีน Sinovac สำหรับอายุ 6 ปี ขึ้นไป (โดส)	วัคซีน AstraZeneca สำหรับเป็นเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (โดส)	วัคซีน Pfizer (ฝ่าม่วง) สำหรับเป็นเข็มที่ 1 และ 2 ผู้ที่มีอายุ 12 - 17 ปี และสำหรับเป็นเข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (โดส)	วัคซีน Pfizer (ฟ้าลิ้ม) เด็กอายุ 5-11 ปี (เข็ม 2 และเข็ม 1 เกือบดก)	รวมจำนวนวัคซีน ที่จัดสรร (โดส)
9	ชัยภูมิ	8,138	60,385	54,991	22,530	146,044
9	นครราชสีมา	19,659	144,848	130,065	54,210	348,783
9	บุรีรัมย์	12,460	95,125	88,003	34,450	230,037
9	สุรินทร์	10,709	72,584	66,427	29,640	179,361
10	มุกดาหาร	2,832	17,830	16,059	7,820	44,541
10	ยโสธร	3,800	25,139	22,549	10,520	62,009
10	ศรีสะเกษ	11,042	69,830	63,176	30,540	174,588
10	อำนาจเจริญ	2,836	22,549	20,740	7,820	53,945
10	อุบลราชธานี	14,800	94,062	83,022	40,880	234,764
11	กระบี่	4,877	32,873	30,557	13,480	81,787
11	ชุมพร	4,146	31,840	28,868	11,430	76,284
11	นครศรีธรรมราช	13,007	87,781	79,343	35,830	215,961
11	พังงา	2,345	18,709	17,356	6,470	44,880
11	ภูเก็ต	3,631	24,004	21,160	10,060	58,855
11	ระนอง	1,548	14,365	13,435	4,290	33,638
11	สุราษฎร์ธานี	9,474	72,417	66,259	26,110	174,260
12	ตรัง	5,456	38,280	36,899	17,890	96,526
12	นราธิวาส	9,127	40,571	37,060	15,460	102,218
12	ปัตตานี	8,432	37,434	36,330	23,260	103,455
12	พัทลุง	4,135	30,966	28,211	14,420	77,731
12	ยะลา	6,693	34,461	31,961	13,270	86,385
12	สงขลา	13,115	78,786	70,397	40,880	203,178
12	สตูล	3,378	20,869	19,405	13,380	57,032
13	กรุงเทพมหานคร	37,882	338,125	282,036	104,270	762,314
สํารองส่วนกลาง		442	1,172	948	3,560	6,122
กรมการแพทย์		-	-	-	120,000	120,000
รวม		500,000	3,750,000	3,350,000	1,500,000	9,100,000



ส่วนที่ ๑๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ ต่อ ๑๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ ต่อ ๑๐๒

ที่ สร ๐๔๑๐.๑๒/คพ.๐

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับมีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ และยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้วัคซีนโควิด 19 เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชาชนไทย จากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๔๓๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีมติให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับการฉีดเป็นเข็มที่ ๑ เข็มที่ ๒ และเข็มกระตุ้น

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดังนี้

๑. การฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับการฉีดเป็นเข็มที่ ๑ และ ๒ สำหรับบุคคลที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป

๑.๑ แนะนำให้ฉีดวัคซีน AstraZeneca จำนวน ๒ เข็ม โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๘ - ๑๒ สัปดาห์

๑.๒ แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน AstraZeneca และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน Pfizer โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ - ๑๒ สัปดาห์

๑.๓ แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน Pfizer และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน AstraZeneca โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๑.๔ แนะนำให้ฉีดวัคซีน Moderna จำนวน ๒ เข็ม โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๒. การฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับบุคคลที่มีอายุ ๕ - ๑๗ ปี

๒.๑ บุคคลที่มีอายุ ๕ - ๖ ปี แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ด้วยวัคซีน Pfizer ฝาสี่เหลี่ยม ขนาด ๑๐ ไมโครกรัม/๐.๒ มิลลิลิตร จำนวน ๒ เข็ม โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๘ สัปดาห์

๒.๒ บุคคลที่มีอายุ ๖ - ๑๑ ปี แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ด้วยวัคซีน Pfizer ฝาสี่เหลี่ยม ขนาด ๑๐ ไมโครกรัม/๐.๒ มิลลิลิตร จำนวน ๒ เข็ม โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๘ สัปดาห์ หรือ ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน Sinovac และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน Pfizer ฝาสี่เหลี่ยม ขนาด ๑๐ ไมโครกรัม/๐.๒ มิลลิลิตร โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๒.๓ บุคคลที่มีอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ด้วยวัคซีน Pfizer ฝาสี่เหลี่ยม ขนาด ๓๐ ไมโครกรัม/๐.๓ มิลลิลิตร จำนวน ๒ เข็ม โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๓ - ๔ สัปดาห์ หรือ ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน Sinovac และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน Pfizer ฝาสี่เหลี่ยม ขนาด ๓๐ ไมโครกรัม/๐.๓ มิลลิลิตร โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์ (แนะนำให้เด็กอายุ ๑๒-๑๗ ปี ที่ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม เข้ารับวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มที่ ๓ ขนาดโดสมาตรฐาน โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ ๒ เป็นเวลาตั้งแต่ ๔-๖ เดือน ขึ้นไป)

๒.๔ บุคคล...

๒.๔ บุคคลที่มีอายุ ๖ - ๑๗ ปี แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ด้วยวัคซีน Sinovac จำนวน ๒ เข็ม โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์ (ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ๒ เข็ม (หรือวัคซีนทางเลือก Sinopharm) ควรเข้ารับการกระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer ๑ เข็ม (ขนาดตามช่วงอายุของผู้รับวัคซีน) โดยมีระยะห่างอย่างน้อย ๔ สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ ๒)

๓. การฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับการฉีดเป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่ ๓

๓.๑ บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac / Sinopharm ครบ ๒ เข็ม แนะนำให้เข้ารับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๒ ตั้งแต่ ๔ สัปดาห์ขึ้นไป

๓.๒ บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac / Sinopharm เป็นเข็มที่ 1 และได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๒ แนะนำให้เข้ารับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๒ ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป

๓.๓ บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac / Sinopharm เป็นเข็มที่ 1 และได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ ๒ แนะนำให้เข้ารับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๒ ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป

๓.๔ บุคคลที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็ม แนะนำให้เข้ารับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๒ ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป

๓.๕ บุคคลที่ได้รับวัคซีน Pfizer ครบ ๒ เข็ม แนะนำให้เข้ารับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๒ ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป

๓.๖ บุคคลที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ 1 และได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ ๒ แนะนำให้เข้ารับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๒ ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป

๓.๗ บุคคลที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็ม สามารถรับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๒ ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้รับวัคซีน ทั้งนี้ หากเว้นระยะห่างจากเข็มที่ ๒ เป็นระยะเวลา ๖ เดือนขึ้นไป จะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนสูตร AstraZeneca ๓ เข็ม ภูมิคุ้มกันอาจไม่สูงเท่าการฉีดวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้น แต่สามารถพิจารณาฉีดในผู้ที่ไม่ต้องการรับวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มกระตุ้น

๔. การฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับการฉีดเป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่ ๔ แนะนำให้วัคซีนเข็มที่ ๔ โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๓ ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป ดังนี้

๔.๑ บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac / Sinopharm ครบ ๒ เข็ม และได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่ ๓ แนะนำให้เข้ารับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๓ ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป

๔.๒ บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac / Sinopharm ครบ ๒ เข็ม และได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่ ๓ แนะนำให้เข้ารับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๓ ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป

๔.๓ บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac / Sinopharm เป็นเข็มที่ ๑ ได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๒ และได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่ ๓ แนะนำให้เข้ารับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๓ ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป

๔.๔ บุคคล..

๔.๔ บุคคลที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็ม และได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่ ๓ แนะนำให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างหลังเข็มที่ ๓ ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป

ทั้งนี้ สามารถให้วัคซีน Moderna เป็นเข็มกระตุ้นได้ในทุกสูตร และกรณีกระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer สามารถฉีดวัคซีนขนาดครึ่งโดสได้ ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน (โดยมีข้อมูลการศึกษาในผู้ใหญ่ที่แข็งแรงดีว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี แต่ไม่มีการศึกษาในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเด็ก)

๕. แนะนำให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 ได้ตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยให้วัคซีนหลังจากการติดเชื้อเป็นเวลา ๓ เดือน

ทั้งนี้ ได้แจ้งการดำเนินงานดังกล่าวไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข